
Algorytm opieki nad potencjalnym dawcą narządów
Zapobieganie hipoksji
Ciśnienie skurczowe >100 mmHg
Zapobieganie zakażeniom
Zapobieganie zaburzeniom wodno-elektrolitowym
Badania laboratoryjne
Zapobieganie hipotermii
Ciśnienie skurczowe <100 mmHg
Jednorazowo obowiązkowo : - HBs Ag, HCV AB, HBc, HIV, CMV, OWA, grupa krwi, rtg klatki piersiowej, EKG, Usg brzucha
Opcjonalnie EBV, PSA, Toxoplazmoza, badania bakteriologiczne
1/dobę Morfologia, koagulogram, badanie ogólne moczu,
Co 6 godzin: Mocznik, kreatynina, elektrolity, gazometria, glikemia
OCŻ <8 cm H20
OCŻ >8 cm H2O
Płynoterapia: koloidy i krystaloidy
Katecholaminy
SAP>199 mmHg
SAP <100 mmHg
Dopamina
Dopamina +noradrenalina
Dopamina +Vasopresyna
Diureza 1-3 ml/kg/min
Moczówka prosta
Oliguria <1 ml/kg/min
Płynoterapia
Furosemid 20 mg
Furosemid 20 mg